





**Figür 1:** SF (izotonik sodyum klorür- serum fizyolojik) ve ExoHair solüsyonlarında; 3, 6 ve 9 saat bekletilen kıl foliküllerinden alınan kesitler **Ki-67** (hücre proliferasyon belirteci) ile immunohistokimyasal olarak boyanmıştır. SF ve ExoHair gruplarında Ki-67 boyanmasında gruplar arasında gözle görülür oranda boyanma farklılıkları görülmüştür. (**T0:** Foliküller hiçbir solüsyonda bekletilmemiştir. **T3:** Foliküller 3 saat solüsyonda bekletilmiştir. **T6:** Foliküller 6 saat solüsyonda bekletilmiştir. **T9:** Foliküller 9 saat solüsyonda bekletilmiştir.).



**Grafik 1:** SF (izotonik sodyum klorür- serum fizyolojik) ve ExoHair solüsyonlarında; 3, 6 ve 9 saat bekletilen kıl foliküllerinde Ki-67 (hücre proliferasyon belirteci) pozitif hücrelerin gruplar arasında istatistiki olarak karşılaştırılması. SF grubu ile ExoHair grubu karşılaştırıldığında; T6 ve T9'da ExoHair grubunda SF grubuna göre, Ki-67 pozitif hücre sayısında ileri derecede anlamlı bir artış görülmüştür (\*\*\*,  $p < 0.001$ , ileri derecede anlamlı).

(T0: Foliküller hiçbir solüsyonda bekletilmemiştir. T3: Foliküller 3 saat solüsyonda bekletilmiştir. T6: Foliküller 6 saat solüsyonda bekletilmiştir. T9: Foliküller 9 saat solüsyonda bekletilmiştir.).